



آموزش به بیمار در بیوپسی کلیه

بیمار عزیز :

بیوپسی کبد به منظور تعیین علت بیماری کلیه انجام می گیرد . به منظور هدایت سوزن بیوپسی به موضع مورد نظر از اولتراسوند استفاده می شود (توسط اولتراسوند محل ورود سوزن بیوپسی تعیین خواهد شد .)

قبل از آزمون :

- قبل از آزمون یک نمونه خون جهت بررسی فاکتورهای انعقادی و شمارش پلاکت گرفته خواهد شد .
- پروسیجر بدون درد است زیرا محل ورود سوزن توسط یک ماده بی حسی ، بی حس خواهد شد .
- ۶-۸ ساعت قبل از پروسیجر باید ناشتا باشید .
- یک مسیر وریدی برقرار خواهد شد .
- توجه داشته باشید نقطه مشخص شده در سونوگرافی در اثر استحمام پاک نشود .

حین انجام آزمون :

- ابتدا یک داروی آرام بخش از طریق مسیر وریدی به شما تزریق خواهد شد .
- شما در وضعیت دمر بر روی تخت معاینه قرار خواهید گرفت .
- پوست محل بیوپسی بعد از ضدعفونی با یک محلول ضدعفونی کننده ، با داروی بی حسی بی حس خواهد شد .
- سوزن بیوپسی در نقطه مشخص شده در سونوگرافی وارد پوست و سپس وارد کلیه خواهد شد . توجه نمایید در حین ورود سوزن نفس خود را نگه دارید .
- در بیوپسی باز بعد از اینکه پزشک یک برش کوچک بر روی کلیه ایجاد کرد ، عمل نمونه برداری را انجام خواهد داد .

پس از آزمون :

- بعد از انجام بیوپسی مراقب بهداشتی به شما کمک خواهد کرد تا در وضعیت درازکش به روی شکم قرار گیرید .
- بر روی محل بیوپسی فشار وارد میشود (به منظور پیشگیری از خونریزی)
- به مدت ۶-۸ ساعت بعد از آزمون در بیمارستان بسترس خواهید شد تا خطر خونریزی به حداقل برسد .
- قبل از ترخیص یک نمونه خون به منظور بررسی تغییرات هموگلوبین و هماتوکریت تهیه خواهد شد .
- از سرفه کردن به مدت ۴ ساعت پس از آزمون خودداری نمایید .
- نبض و فشار خون یک ساعت اول پس از آزمون هر ۱۵ دقیقه و ساعت دوم هر ۳۰ دقیقه و سپس تا پایدار شدن وضعیت شما توسط مراقب بهداشتی کنترل و ثبت خواهد شد .
- تا ۲۴ ساعت بعد از بیوپسی باید استراحت نمایید .
- ممکن است تا ۲۴ ساعت پس از انجام آزمون ادرار شما خونی باشد که جای نگرانی نیست .



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
مرکز آموزشی درمانی ولایت

دفتر پرستاری
واحد آموزش

- مصرف حداقل ۳ لیتر مایعات در روز را حفظ نمایید .
- در صورتی که دچار درد مبهم شکمی ، سوزش ادرار ، کمردرد ، درد شانه ، بی اشتهایی ، استفراغ شدید باید فوراً به پزشک اطلاع دهید .